Trois observations sur la fistule a l'anus operée avec l'instrument de Mr Brambilla.

Premiere

Le 20 du mois d'octobre l'année 1776 Mr L. Lieute-
-nant Colonel vint me consulter pour une dureté qu'il
avoit depuis cinque ans dans la fesse droite a la suite
d'un abces a l'anus. La dureté comencoit a un pouce
de l'anus, et terminoit a six pouces de longueur
dans la fesse ; j'ai decouvert au bout de la dureté
a la fesse un tres petit orifice fistuleux, qui donnoit
un peu de pus en le comprimant.

Je lui fis appliquer des cataplasmes faits avec des
herbes ammollientes cuites dans du lait, c'est qu'il
continua pendant quelques jours, et la dureté fut
considerablement ammollite. C'etoit allors, que
j'entrepris d'esaminer l'état de la fistule par le
moyen d'une sonde.

J'ai decouvert un sinus tres profond, qui s'et-
-tendoit vers l'orifice de l'anus, que j'ai dilaté
faisant une incision longue de 4 pouces. Le troi-
-sieme jour, je m'etois apperçu d'un autre sinus
qui s'ettendoit vers l'os coccigis, et que j'ai dilaté
de meme, et qui etoit de la largeur d'un petit ecu.

Les premiers jours il fut pansé avec de la
Therebentine dissoute avec du jaune d'œuf, et a la
suite avec du miel rosat, et on eut soin de remplir
legerment tout l'ulcere avec des bordonets de Charpie.

Le Malade me raconta, qu'il avoit ete sujet
pendant plusieures années de sa Maladie a avoir
touttes les 3 ou 4 semaines une tumeur doulou-
-reuse formée dans la partie affectée, la quelle dispa-
-roissoit communement apres qu'il en etoit sortie
spontanement pendant quelques jours une certaine

ARC 56 - n° 64

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

quantité de pus; Lorsqu'il etoit sorti le Malade se trouvoit soulagé, et croyoit que l'ouverture de l'absces s'etoit consolidée, quoique il trouvoit toujours quelque petite tache dans sa chemise. Dans les dernieres années la tumeur s'ouvrit habituellement avec profusion tous les 15 jours et meme en moins de tems.

Apres avoir dilatés les deux sinus, j'aurois eu lieu de croire, qu'il n'y en avoit point d'autre, si l'experience ne m'eut pas enseignée, che les fistules dans ces parties ont presque toujours une communication avec l'intestin, ou au moins leur dirrection vers cette partie, c'est pourquoi j'ai suspendu de decider sur la nature du mal et sur la source de la matiere, jusque je pouvois m'en assurer.

Vers le tems precis ou la matière s'etoit habituellement accumullée, j'ai observé qu'il en sortoit une plus grande quantité par l'ouverture que les jours antecedens, et en examinant le fond du second sinus, j'ai eu quelque peine a y decouvrir une petite ouverture, qui conduisoit en ligne oblique vers l'intestin Rectum, et deux jours d'apres, j'en fis la dilatation avec mon instrument pour la fistule en presence de plusieurs Chirurgiens. La fistule etoit incomplette et si profonde, que j'eus de la peine a atteindre avec mon doigt la pointe de ma sonde, que j'avois introduite dans la petite ouverture du sinus.

J'ai remplie la playe legerement selon ma coutume avec des bordonets.

En trouvant le lendemain le malade et tout l'appareil en bon etat, je ne l'ai pas pansé

quantité de pus; Lorsqu'il etoit sorti le Malade se trouvoit soulagé, et croyoit que l'ouverture de l'absces s'etoit consolidée, quoique il trouvoit toujours quelque petite tache dans sa chemise. Dans les dernieres années la tumeur s'ouvrit habituellement avec profusion tous les 15 jours et meme en moins de tems.

Apres avoir dilatés les deux sinus, j'aurois eu lieu de croire, qu'il n'y en avoit point d'autre, si l'experience ne m'eut pas enseignée, che les fistules dans ces parties ont presque toujours une communication avec l'intestin, ou au moins leur dirrection vers cette partie, c'est pourquoi j'ai suspendu de decider sur la nature du mal et sur la source de la matiere, jusque je pouvois m'en assurer.

Vers le tems precis ou la matière s'etoit habituellement accumullée, j'ai observé qu'il en sortoit une plus grande quantité par l'ouverture que les jours antecedens, et en examinant le fond du second sinus, j'ai eu quelque peine a y decouvrir une petite ouverture, qui conduisoit en ligne oblique vers l'intestin Rectum, et deux jours d'apres, j'en fis la dilatation avec mon instrument pour la fistule en presence de plusieurs Chirurgiens. La fistule etoit incomplette et si profonde, que j'eus de la peine a atteindre avec mon doigt la pointe de ma sonde, que j'avois introduite dans la petite ouverture du sinus.

J'ai remplie la playe legerement selon ma coutume avec des bordonets.

En trouvant le lendemain le malade et tout l'appareil en bon etat, je ne l'ai pas pansé

Les jours d'après j'ai remplacé ces bordonets avec d'autres imbibés dans du vin, et du miel rosat. L'on continua les pansemens en joignant plus du miel rosat au vin, et vers la fin un peu du baume de Perou, et de tems en tems l'on touchoit superficiellement la playe avec la pierre infernale.

En suivant cette Methode, il fut guerit au bout de cinque semaines, et l'anus se trouva après la guerison si etroit, qu'on auroit eu de la peine a y introduire un doigt.

Seconde

Mr Wideman Caissier de l'Archiduche d'Autriche d'une tres parfaite consitution avoit une fistule complette a l'anus depuis un ans laissé par un absces, qui comencoit dessous l'os coccigis, et entroit dans l'intestin Rectum de la profondeur de deux pouces et demie; J'ai lui fis prendre un purgatif avec de la manne le 28 Janvier, qui fit un bon effett. Le jour suivant je lui fis l'operation avec mon instrument, je l'ai pansé legerement avec des bordonets couvert de Therebentine dissout avec du jaune d'oeuf pendant sixe jours apres quoi, j'y substituai du miel des roses, et en onze jours il fut entierement cicatrisé. Il est bien fait de savoir, qu'il se tenoit au lit, et observoit pendant ces jours une diete rigoureuse, de facon, qu'il n'avoit qu'une seule selle pendant les onze jours.

Troisième

L'année 1767 le 3 de Juillet j'ai operée avec

ACADEMIE [illegible] MEDECINE BIBLIOTHEQUE

mon instrument une fistule complette de deux pouces
de profondeur au Periné du Recteur Frosch des
Pierrist, ayant premierement scarifié las calosités
qui s'y etoient formées a l'ouverture externe de
la fistule. La playe avoit trois pouces de profon-
deur. Les premiers jours il fut pansé avec de
la Therebentine dissoute avec du jaune d'oeuf,
et a la fin avec l'onguent de Tutie, et le baume
de Perou.

Il fut touché quelques fois superficiellement
avec la pierre infernale, et le Malade fut
guerit en trois semaines.

N.o 6